


MD-Gastroview®

Diatrizoato de Meglumina

Diatrizoato de Sodio



Es un Medio de Contraste radiopaco yodado, hidrosoluble, de sabor agradable vainilla-limón, para administración oral o rectal. Cada ml. contiene 660 mg. de diatrizoato de meglumina y 100 mg. de diatrizoato de sodio; el pH ha sido ajustado a 6.0 a 7.6. cada ml. contiene aproximadamente 4.8 mg. de sodio y 367 mg. de yodo orgánicamente fijado.

INDICACIONES

El MD-GASTROVIEW está indicado para el examen radiográfico de segmentos del tracto gastrointestinal. Puede ser usado como agente adicional en el acrecentamiento de contraste en la tomografía computada de cuerpo; la preparación está indicada, en conjunción con la administración intravenosa de un agente de contraste radiopaco, cuando la imagenología sin acrecentar pueda que no provea suficiente definición en distingue sinuosidades normales del intestino de los órganos adyacentes o áreas con sospecha de patología.

DOSIS Y ADMINISTRACION

Este medio de contraste no deberá usarse para la preparación de soluciones para la administración paraneural.

Las medidas preparatorias de rutina empleadas para estudios de bario son también apropiadas para este agente.

Para pacientes pediátricos y severamente caquéticos, el mantenimiento de una línea de líquidos intravenosos puede ser aconsejable.

Para el examen radiográfico del segmento del tracto gastrointestinal, la dosis oral adulta puede variar des 30 a 90 ml (11 a 33 g. de yodo)

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Hipersensibilidad a medios de contraste rodados, torotoxicosis, adminístrese con precaución en pacientes con insuficiencia hepática o renal, inmunoglobulinopatias, mielona múltiple, embarazo.

PRECAUCIONES

- ✚ Se debe valorar al paciente previa a la administración del contraste, teniendo en cuenta a los pacientes de alto riesgo o con reacción previa al contraste yodado.
- ✚ La administración rectal a grandes dosis puede provocar irritación de la mucosa.
- ✚ Los pacientes con patología tiroidea pueden reaccionar, dando un cuadro de hipertiroidismo.

SUGERENCIAS

- ✚ Una dilución 1/4.6 de MD Gastroview, proporciona una solución isotónica de aproximadamente 16.5 % de sales de diatrizoato, sin embargo las soluciones menos diluidas son hipertónicas, lo que puede provocar movimiento intraluminal de líquidos, dando lugar a una hipovolemia. En niños y ancianos, esto puede provocar un estado de choque por pérdida de líquidos.
- ✚ Se debe hidratar adecuadamente al paciente antes y después del estudio.

FORMULA

Cada mililitro contiene:

	CONRAY 60%	CONRAY 43%
Iotalamato de meglumina	600mg	430mg
Edetato cálcico disodio (estabilizador)	0.09mg	0.110 mg
Fosfato monosódico de sodio (buffer)	0.125mg	0.015 mg

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

	CONRAY 60%	CONRAY 43%
--	------------	------------

Contenido de Yodo	282 mg/ml (28.2%)	202 mg/ml (43%)
Osmolaridad	1000 mOsm/ l	1 074 mOsm/Kg
Osmolalidad	1400 mOsm/ Kg	
Viscosidad	25 °C = 6 y 37 °C = 6	37° C = 2.0

INDICACIONES:

	Angiografía Cerebral	Arteriografía periférica	Angiografía Intravenosa por sustracción digital	Angiografía arterial por sustracción digital	Venografía	TC Cabeza	TC Pecho y abdomen	Colangiografía directa	Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica	Artrografía	Urografía por infusión IV	Urografía excretora
Conray 60%												
Conray 43%												

CONTRAINDICACIONES

MIELOGRAFIA

LINFOGRAFIA

PRESENTACIONES

Producto	Concentración	Presentación
Conray	60%	Viales de 20, 30 50 ml
Conray 43	43%	Botellas 150 ml

POSOLOGIA SUGERIDA

PRODUCTO

INDICACIONES

CONRAY 60
30ml - 50 ml

Angiografía Cerebral: Carótida y vertebral
Braquial
Periférica: Arterias y venas
Angiografía por sustracción Digital
Urografía
Artrografía

POSOLOGIA RECOMENDADA

6 - 10 ml
35 - 50 ml
20 - 40 ml
10 - 25 ml
30 - 60 ml
5 - 15 ml