

MD-76®R

Diatrizoato de meglumina 66%

Diatrizoato de sodio 10%.

Inyección



El MD76R (inyección de diatrizoato de meglumina y diatrizoato de sodio) es un agente de contraste radiopaco que se surte como una solución acuosa estéril. Indicada para administrarse por vía intravascular. MD76-R contiene 66% p/v 1(deoxi-1-1(metilamino) D-glucitol 3,5-diacetamido-2,4,6,-triyodobenzoato (sal) y 10% p/v monosodio 3,4-dioacetamido-2,4,6,-triiodobenzoato.

Cada mL contiene aproximadamente 3.65 mg (0.16mEq) sodio y 370 mg de yodo ligado orgánicamente. En el momento de su fabricación el aire en el contenedor se sustituye por nitrógeno.

FORMULA

Cada mililitro contiene:

Diatrizoato de meglumina	660 mg
Diatrizoato de sodio	100 mg
Edetato de sodio y calcio.....	0.11 mg
Fosfato monobásico de sodio (buffer)....	0.125 mg

PROPIEDADES

Contenido de yodo.....	370 mg/mL
Contenido de sodio.....	4.5 mg/mL
Viscosidad a 37°C	9.8 cps
osmolalidad de 1551 mOsm/Kg.	

INDICACIONES

Urografía excretora
Tomografía de cabeza (con barrera hematoencefálica intacta)
Tomografía de cuerpo
Aortografía
Ventriculografía
Angiocardiógrafía
Angiografía por Sustracción digital
Angiografía cerebral
Angiografía Periférica.

CONTRAINDICACIONES

No es para uso intratecal:

Mielografía, ventriculografía, cisternografía.

PRESENTACIONES

Frasco con 50 mL, 100 mL, 150 mL.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN.

El MD76R deberá estar a **temperatura corporal** cuando se inyecte y puede necesitar ser calentado antes de usarse. Si se conserva en una jeringa por tiempo prolongado antes de la inyección deberá **protegerse de la exposición a luz intensa**.

Deberá ser administrado con **aguja de 18 Ga.**

Administrar **solución fisiológica para lavado del vaso después de su administración.**

No permitir **mezcla** del medio de **contraste** con **sangre en la aguja o catéter**, para evitar la **coagulación**.

PRECAUCIONES

Calentar a 37°C antes de emplearse

ALMACENAMIENTO

Protéjase de la luz.
Mantener en lugar fresco y seco.
Consérvese a temperatura ambiente